

Liste des taxons notés le mercredi 2 septembre 2026

Etat imprimé le 8 septembre 2026 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B. BOCK & al.)

Pour cette sortie de reprise de nos activités après un été caniculaire, nous avons organisé une sortie en zones humides au bord des étangs de Cherisy où la flore est encore en bon état. Les 12 participants ont même eu la surprise d'observer des bolets assez nombreux (le Bolet blafard et le Bolet radicant en mélange). La sortie s'est terminée par la cueillette de cornouilles. Ci-contre, le Bolet blafard © Benoit BOCK.


<https://www.photoflora.fr/of/CartoFlora.php?c=BenoitBOCK20260902R1>



mercredi 2 septembre 2026

France - 28 : Cherisy - Bord des étangs du roi, des Guérets et de la Ballastrière

avec : PORTE William, GALAND Christian, LALLEMENT Nicole, MOREAU Nicole, MICHEL Jocelyne, QUITARD Fanny, BRUNEAU Eric, GIRAULT Nathalie, BIGOT Chantal, BUISSON Michel, MÉNÉGOZ Anne & BOCK Benoît



Lichens - Champignons

Agrocybe sp. [Bolbitiaceae]

<https://www.google.fr/search?q=Agrocybe+sp.+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Caloboletus radicans (Pers. : Fr.) Vizzini [Boletaceae]

Bolet radicant

<https://www.google.fr/search?q=Caloboletus+radicans+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Suilellus luridus (Schaeff.) Murrill []

Bolet blafard

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2209637>

Chapeau : 5-20 cm, sec et souvent velouté, ocracé rosâtre à rose ± mêlé à du brun ou de l'olivâtre, mais parfois aussi beaucoup plus rouge. tubes: jaune clair, puis olivâtres, bleuissants. Pores : fins, jaunes puis rapidement rouge orangé, bleuissants. Pied : 5-15 x 1,5-5 cm, jaune ± orangé avec souvent un net réseau rougeâtre en relief, à mailles complexes. Chair: blanchâtre ou jaunâtre, avec souvent une ligne rouge juste au-dessus des tubes. Saveur et odeur faibles.

Trametes sp. [Polyporaceae]

<https://www.google.fr/search?q=Trametes+sp.+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>



Gymnospermes

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl. [Cupressaceae]

Petit-Cyprès de Lawson

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7294>

Cultivé, parfois naturalisé



Angiospermes Monocotylédones

Alisma plantago-aquatica L. [Alismataceae]

Alisme commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5785>

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl [Poaceae]

Fromental élevé

ARRHEN = mâle, viril, fort et ATHER = pointe - La fleur mâle est munie d'une grande arrête à insertion basale.

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8654>

Avoine (arêtes dorsales), de grande taille (souvent plus de 1 m de haut), en touffe lâche. Grande panicule étroitement diffuse, portant de nombreux épillets blanchâtres d'environ 8 mm. La 1ère fleur est mâle à lemme inférieure portant une longue arête coudée insérée à la base, la seconde fleur hermaphrodite à lemme à arête subterminale plus ou moins développée.

Parfois cultivée comme fourrage.

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. [Poaceae]

Brachypode commun au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6673>

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. [Poaceae]

Brachypode des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6674>

Carex remota L. [Cyperaceae]

Carex espacé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5969>

Carex sylvatica Huds. [Cyperaceae]

Carex des bois

<https://www.google.fr/search?q=Carex+sylvatica+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Cespitueuse hétérostachyée. Utricules brunâtres, longs de 4-5,5 mm, distinctement nervés, progressivement rétrécis en un bec long, étroit et bifide ; épis ♀ longuement pédonculés à pédoncule scabre, au moins l'épi inf. pendant ; feuilles larges de 3-6 (9) mm, vert clair.

Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John [Hydrocharitaceae]

Élodée de Nuttall

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6068>

Eragrostis minor Host [Poaceae]

Éragrostis Petit

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6817>

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. [Poaceae]

Glycérie Grande

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6932>

Plante toxique à hétérosides cyanogéniques

Iris pseudacorus L. [Iridaceae]

Iris des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6103>

Plante robuste pouvant dépasser 1 m de haut, formant des colonies denses et importantes au bord des eaux, à larges feuilles (15 à 20 mm) glauques et à tiges portant plusieurs fleurs pédonculées d'un jaune vif.

La fleur aurait inspiré le blason des rois de France sous le nom de fleur de Lys (soit en relation avec la rivière Lys, soit par déformation de fleur de Louis porté par le roi Louis VII notamment sur son sceau).

■ ***Juncus inflexus*** L. [Juncaceae]

Jonc glauque

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6146>

Grand jonc (jusqu'à 1 m) vivace cespiteux à tiges très glauques et gaines brillantes d'un pourpre-noir, à inflorescences lâches composées de fleurs à tépales longuement acuminés. Feuilles cloisonnées.

■ ***Lemna minuta*** Kunth [Araceae]

Lentille-d'eau minuscule

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6204>

■ ***Phragmites australis*** (Cav.) Trin. ex Steud. [Poaceae]

Roseau commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7063>

■ ***Sagittaria sagittifolia*** L. [Alismataceae]

Sagittaire commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5793>

■ ***Spirodela polyrrhiza*** (L.) Schleid. [Araceae]

Lentille-d'eau Grande

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6208>

 Angiospermes Dicotylédones

■ ***Acer campestre*** L. [Sapindaceae]

Érable champêtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8522>

Arbuste en général peu élevé (moins de 5 m, sauf exception), à feuilles de taille moyenne (10 cm max.), à 5 lobes arrondis et profonds et à samares aux ailes disposées en ligne droite.

Vit jusqu'à 200 ans. Parfois, comme les ormes, les rameaux développent parfois une couche de liège. Peut être utilisé comme un bois d'œuvre et comme arbre d'ornement. Mais la faible largeur du tronc rend son bois rare.

■ ***Agrimonia eupatoria*** L. subsp. ***eupatoria*** [Rosaceae]

Aigremoine Petite

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4630>

Grande rosacée (jusqu'à 1 m de haut) vivace à tige munie de poils de différente longueur, à feuilles divisées en folioles séparées, à fleurs jaunes en longues grappes, et à curieux fruits surmontés de nombreux crochets à son extrémité et à hypanthium sillonné sur les 3/4 de leur longueur.

Souvent employée comme tonique et astringente.

■ ***Ailanthus altissima*** (Mill.) Swingle [Simaroubaceae]

Ailante glanduleux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5537>

Arbre fortement drageonnant à écorce verruqueuse puis ridée de couleur brun pâle. Jeunes rameaux poilus. Feuilles de 20 à 60 cm, à 9 à 27 folioles brièvement pétioolées, vert clair à jaunâtre, souvent de teinte cuivrée lors de leur déploiement et dégageant une odeur de cacahuète grillée lorsqu'on les froisse, à pétiole de moins de 30 % de la longueur du limbe.

Les inflorescences se présentent en panicules axillaires de 10 à 30 cm de long, groupées à l'extrémité des rameaux, formant souvent une grosse masse globuleuse à la fructification. Les samares de 25 à 45 mm et de forme fusiforme aux deux extrémités obtuses sont torsadées en spirale et deviennent rougeâtres à maturité. Les graines, de forme arrondie, mesurent de 4 à 6 mm de diamètre.

Nourrit un Bombyx à soie. Le père jésuite Pierre d'Incarville a expédié de Chine des plants d'Ailante au Chelsea Physic Garden de Londres en 1751 et vers 1760 au Jardin Botanique de Padoue en Italie. La culture de cet arbre comme plante ornementale s'est diffusée pendant la seconde moitié du 18ème siècle, et rapidement, il s'est acclimaté et propagé dans l'Europe entière où il est considéré maintenant comme invasif !

■ ***Alnus glutinosa*** (L.) Gaertn. [Betulaceae]

Aulne glutineux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1321>

En symbiose avec un actinomycète du genre Frankia fixateur d'azote atm.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, feuille, bourgeon de feuille.

■ ***Angelica sylvestris*** L. [Apiaceae]

Angélique des prés au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8614>

■ ***Arctium lappa*** L. [Asteraceae]

Bardane Grande

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=416>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ ***Argentina anserina*** (L.) Rydb. [Rosaceae]

Ansérine commune au sens large

<https://www.google.fr/search?q=Argentina+anserina+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ ***Artemisia vulgaris*** L. [Asteraceae]

Armoise commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=459>

Grande composée en touffe dépassant facilement 1 m de haut, reconnaissable à ses feuilles dont les folioles sont profondément dentées, blanchâtres dessous à son odeur faible et désagréable, à ses inflorescences rameuses très amples et à ses souches non ou très brièvement stolonifères.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fleur, tige - thuyones, eucalyptol, camphre à surveiller - L'huile essentielle de cette plante est interdite.

■ ***Aucuba japonica*** Thunb. [Garryaceae]

Aucuba du Japon

<https://www.google.fr/search?q=Aucuba+japonica+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ ***Bidens cernua*** L. [Asteraceae]

Bident penché

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=501>

■ ***Bidens frondosa*** L. [Asteraceae]

Bident feuillu

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=504>

Originaire d'Amérique du Nord, ce Bident a été observée en France pour la première fois à Paris en 1920, mais il est mentionné comme cultivé au jardin botanique de Montpellier en 1762 d'où il aurait pu s'échapper. Aujourd'hui il supplante fréquemment des espèces européennes, notamment *Bidens tripartita* L., qui par conséquence se raréfie.

■ ***Brugmansia arborea*** (L.) Sweet [Solanaceae]

<https://www.google.fr/search?q=Brugmansia+arborea+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ ***Bryonia dioica*** Jacq. [Cucurbitaceae]

Bryone dioïque

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2547>

■ ***Caltha palustris*** L. [Ranunculaceae]

Populage des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=29999>

■ ***Ceratophyllum demersum*** L. [Ceratophyllaceae]

Cératophylle commun

DEMERS = submergé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2301>

■ ***Cirsium arvense*** (L.) Scop. [Asteraceae]

Cirse des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=664>

■ ***Clematis vitalba*** L. [Ranunculaceae]

Clématite des haies

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4436>

■ ***Convolvulus sepium*** L. [Convolvulaceae]

Liseron des haies au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2448>

■ ***Cornus mas*** L. [Cornaceae]

Cornouiller mâle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2475>

Connu pour ses fruits appelés cornouilles, comestibles

■ ***Cornus sanguinea*** L. [Cornaceae]

Cornouiller sanguin au sens large

<https://www.google.fr/search?q=Cornus+sanguinea+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ ***Crataegus monogyna*** Jacq. [Rosaceae]

Aubépine monogyne

Mono = unique, gyn = femme - les fleurs n'ont qu'un seul ovaire (donc 1 seul style et les fruits une seule graine)

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4721>

Vit jusqu'à 500 ans; Hermaphrodite; rejette de souche; régulatrice de la régulation et sédatrice. Les jeunes feuilles et bourgeons, avant floraison, sont comestibles crues ou cuites.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, feuille, sommité fleurie - flavonoïdes, proanthocyanidols à surveiller

***Crataegus* sp.** [Rosaceae]

Aubépine au sens large

<https://www.google.fr/search?q=Crataegus+sp.+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ ***Daucus carota*** L. [Apiaceae]

Carotte commune au sens très large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=151>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ ***Dipsacus fullonum*** L. [Caprifoliaceae]

Cardère commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2584>

■ ***Epilobium hirsutum*** L. [Onagraceae]

Épilobe hirsute

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3891>

Vivace dressée, à tiges souterraines traçantes, à feuilles inférieures opposées. Tige et feuilles hérissées de poils longs visibles de loin à l'œil nu dans la partie médiane (mais glabres à la base). Feuilles à limbes lancéolés, dentés, sessiles et embrassant la moitié de la tige (donc adjacents 2 à 2). Grandes fleurs à pétales pourpres de 1,5 - 2 cm et à style portant 4 stigmates étalés en croix.

■ ***Erigeron sumatrensis*** Retz. [Asteraceae]

Vergette de Sumatra

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=702>

L'espèce est native d'Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Uruguay et régions adjacentes). Son nom est trompeur : Retzius l'a décrit en 1789 à partir de spécimens supposément collectés à Sumatra, mais il s'agissait vraisemblablement d'un matériel déjà introduit et naturalisé en Asie du Sud-Est à l'époque, ou d'une erreur d'étiquetage d'herbier — pratique malheureusement courante au XVIIIe siècle. Elle est mentionnée en Europe dès 1875.

■ ***Eupatorium cannabinum*** L. subsp. ***cannabinum*** [Asteraceae]

Eupatoire chanvrine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9976>

■ **Filipendula ulmaria** (L.) Maxim. [Rosaceae]

Reine-des-prés Grande

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4740>

Plante herbacée très haute (plus de 1 m), à feuilles divisées en 3 à 5 paires de grandes folioles (6 x 3 cm) et à fleurs blanches, nombreuses, en corymbes amples. Fleurs à odeur de miel peu sucré. Face inférieure des feuilles banches ou vertes (var. *denuadata*)

Pl. vulnérable, astringente, tonique, préconisée contre l'hydropisie. Les fl. (fraîches ou sèches) sont utilisées en tisane.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fleur, sommité fleurie - dérivés salicylés à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi aux personnes souffrant d'allergie aux dérivés salicylés.

■ **Fraxinus excelsior** L. subsp. **excelsior** var. **excelsior**

[Oleaceae]

Frêne élevé de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30618>

Diurétique, hypotensive, antirhumatismal, antilithiasique.

■ **Galium palustre** L. [Rubiaceae]

Gaillet des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5063>

■ **Geranium robertianum** L. [Geraniaceae]

Géranium herbe-à-Robert

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3435>

Plante annuelle d'un vert sombre, à axes souvent rouge sombre, présentant une ou plusieurs tiges ramifiées, souvent renflées aux nœuds. Feuilles toutes pétiolées à limbe triangulaire divisé en 3 à 5 segments subtriangulaires pétiolulés. Inflorescences en cyme biflore à pédoncule environ égal à la feuille axillaire adjacente. Pédicelles restant dressés généralement inférieurs ou égaux aux sépales à l'anthèse. Calice long de 4 à 8 millimètres, urcéolé même à l'anthèse, non accrescent, dont les sépales sont terminés par une arête de plus de 1,5 à 2,5 mm de long munis de poils inégaux jusqu'à 3 mm. Pétales longs de 8 à 16 millimètres, dont au moins la moitié correspond à l'onglet, à limbe cunéiforme, entier, de couleur rose avec trois veines blanchâtres ou pourpres. Anthères longues de 0,4-0,7 mm, oranges, rose vif ou pourpres avant leur déhiscence. Fruit de 15 à 25 millimètres à complet développement à méricarpes glabres se détachant de l'arête lors de la déhiscence. Axes à poils glanduleux étalés et de courts poils simples rétroscissiles.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes. Au Moyen-Age, la plante aurait été nommée Herba-Ruperti, en l'honneur de St-Robert, 1er évêque de Salzbourg (VIII^e siècle; fête le 27 mars), qui en aurait enseigné les propriétés thérapeutiques, mais aussi peut-être du latin *ruber*, rouge [1949, FOURNIER]. Les anciens lui avaient donné le nom de Ruberta, Rubertiana (de *ruber*, rouge) d'où, par corruption, il a été appelé "Rubert", "Robert", puis "Herbe-à-Robert [BONNIER, 3 : 179]

■ **Helminthotheca echioides** (L.) Holub [Asteraceae]

Picris langue-de-bœuf

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1101>

Grande plante annuelle ou bisannuelle, rugueuse et ramifiée à grandes feuilles embrassantes munies de poils raides partant d'une protubérance et capitules entourés de larges bractées foliacées, à fruits brusquement terminés par un fruit très long.

■ **Heracleum sphondylium** L. [Apiaceae]

Berce sphondyle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=187>

■ **Humulus lupulus** L. [Cannabaceae]

Houblon d'Europe

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1947>

■ **Impatiens glandulifera** Royle [Balsaminaceae]

Balsamine de l'Himalaya

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1307>

Espèce originaire de L'Himalaya introduite en Europe en 1839 à des fins ornementales, Elle se naturalise autour de Clermont en 1915 puis devient rapidement invasive.

■ **Jacobaea vulgaris** Gaertn. [Asteraceae]

Sèneçon jacobée au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1180>

■ **Juglans regia** L. [Juglandaceae]

Noyer commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3506>

Les feuilles et le brou contiennent plusieurs principes colorants dont la juglone, une naphtoquinone. Une fermentation longue est nécessaire.

■ **Lactuca serriola** L. [Asteraceae]

Laitue scarole

Lactuca est le nom latin de la laitue. Lact = lait car la plante contient du latex

<https://www.google.fr/search?q=Lactuca+serriola+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Considérée comme la forme sauvage de la laitue cultivée avec laquelle elle montre une remarquable capacité d'hybridation.

■ **Ligustrum vulgare** L. [Oleaceae]

Troène commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3955>

■ **Linaria vulgaris** Mill. [Plantaginaceae]

Linare commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5377>

■ **Lonicera japonica** Thunb. [Caprifoliaceae]

Chèvrefeuille du Japon au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1961>

Espèce originaire de Chine et du Japon mentionnée dès 1805 et introduite pour l'ornement

■ **Lotus pedunculatus** Cav. [Fabaceae]

Lotier des fanges

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3004>

■ **Lycopus europaeus** L. [Lamiaceae]

Lycopce d'Europe

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3576>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - coumarines, alcaloïdes à surveiller

■ **Lysimachia nummularia** L. [Primulaceae]

Lysimaque nummulaire

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4349>

■ **Lysimachia vulgaris** L. [Primulaceae]

Lysimaque commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30227>

■ **Malva neglecta** Wallr. [Malvaceae]

Mauve négligée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3827>

■ **Medicago sativa** L. [Fabaceae]

Luzerne commune au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3041>

Contient de la vitamine K1 (contre anticoagulant).

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille - coumestrol, coumarines, alcaloïdes pyrrolidiniques à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'usage chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein.

■ **Mentha aquatica** L. [Lamiaceae]

Menthe aquatique

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3584>

■ **Mentha suaveolens** Ehrh. [Lamiaceae]

Menthe suave

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3593>

■ **Nuphar lutea** (L.) Sm. [Nymphaeaceae]

Nuphar jaune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3867>

Médicinal

■ **Odontites vernus** subsp. **serotinus** (Coss. & Germ.)

Corb. [Orobanchaceae]

Odontite commun d'automne

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5407>

Hémiparasite qui puise la sève brute dans les racines des plantes voisines

■ **Origanum vulgare** L. [Lamiaceae]

Origan commun au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3618>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - carvacrol à surveiller

■ **Parthenocissus inserta** (A.Kern.) Fritsch [Vitaceae]

Vigne-vierge commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5768>

Originaire du nord et de l'ouest de l'Amérique du Nord, introduite en Grande Bretagne dès 1821.

■ **Pastinaca sativa** L. [Apiaceae]

Panais commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=237>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ **Persicaria hydropiper** (L.) Delarbre [Polygonaceae]

Persicaire poivre-d'eau

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4230>

Annuelle à tige dressée ou couchée, rameuse. Plante à saveur poivrée (la seule de ce genre). Feuilles lancéolées, atténuées aux 2 extrémités à largeur maximum vers la base, à pétiole court. Ochrées presque glabres avec quelques cils de 0,2 à 3 mm au bord. Fleurs verdâtres rarement roses ou blanches en épis grêles, lâches, généralement arqués-pendants. Péricône à 4 divisions, densément ponctué de glandes.

■ **Picris hieracioides** L. [Asteraceae]

Picris fausse-épervière

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1102>

■ **Plantago major** L. [Plantaginaceae]

Plantain majeur

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4096>

Espèce toujours reconnaissable à ses très larges feuilles (5 à 10 cm), glabres et pétiolées, un peu dentées, souvent cordiformes et à ses inflorescences très longues (pouvant dépasser 10 cm)

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille

■ **Polygonum aviculare** L. [Polygonaceae]

Centinode des oiseaux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4224>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes, graine

■ **Populus alba** L. [Salicaceae]

Peuplier blanc

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5124>

Vit jusqu'à 300-400 ans

■ *Potentilla reptans* L. [Rosaceae]

Potentille rampante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4818>

Plante stolonifère, couchée et radicante, velue à feuilles composées-palmées presque toutes à 5 folioles (rarement 7) à folioles obovales allongées, vertes dessus. Fleurs isolées aux nœuds sur de très longs pédicelles à 5 pétales jaune vif de 6-12 mm, dépassant nettement le calice. Réceptacle bombé, non charnu, portant de nombreux akènes (plus de 60).

Pl. astringente, vulnérable et tonique

■ *Prunus mahaleb* L. [Rosaceae]

Cerisier de sainte-Lucie

De l'arabe : ma = sans - haleb = lait > la plante aurait été utilisée pour stopper la lactation

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4842>

■ *Prunus spinosa* L. [Rosaceae]

Prunellier commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4847>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, feuille, fleur

■ *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh. [Asteraceae]

Pulicaire dysentérique

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1111>

Pl. employée contre la dysentérie

■ *Pyracantha coccinea* M.Roem. [Rosaceae]

Pyracantha écarlate

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4850>

■ *Reseda lutea* L. [Resedaceae]

Réséda jaune au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30314>

■ *Rhus typhina* L. [Anacardiaceae]

Sumac vinaigrier

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13798>

■ *Robinia pseudoacacia* L. [Fabaceae]

Robinier faux-acacia

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3124>

Genre dédié par Linné à Jean Robin (1550-1629), jardinier du roi Henri IV, ainsi qu'à son fils Vespasien Robin. Jean Robin l'a introduit en France en 1601, à partir de graines nord-américaines récoltées dans les Appalaches, offertes par le botaniste anglais John Tradescant l'ancien. Le robinier du square René-Viviani, dans le 5e arrondissement, juste en face de la cathédrale Notre-Dame, aurait été semé en 1601 ou 1602 par Jean Robin (Peabody, 1982). C'est le plus vieux arbre de la capitale. Occasionne des intoxications parfois graves chez les chevaux, en particulier lors d'ingestion de fruits, les graines concentrant les produits toxiques. Les symptômes sont des nausées, des diarrhées, une irritation, une mydriase et, dans les cas les plus sévères, une insuffisance respiratoire aiguë allant jusqu'à la mort. En revanche les fleurs sont comestibles (beignets, gâteaux, ...)

■ *Rosa canina* L. [Rosaceae]

Rosier des chiens

CANIN = de chien

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4863>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - faux fruit (cynorrhodon), fleur, jeune pousse

■ *Rubus caesius* L. [Rosaceae]

Ronce bleue

RUB = ronce ; CAESI = bleu pâle un peu gris de vert

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4910>

Ronce prostrée, à 3 folioles, sans poils sur les tiges et à pétiole sillonné sur toute sa longueur

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fruit

■ *Rumex obtusifolius* L. [Polygonaceae]

Oseille pareille

RUMEX = plante à feuille pointue ; OBTU = obtus ; FOLIA = feuille

<https://www.google.fr/search?q=Rumex+obtusifolius+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Grande plante vivace à grosse racine pivotante, à feuille sans saveur d'oseille. Tige ramifiée dans le haut (angle des rameaux de 30 à 70°). Feuilles inférieures grandes, pétioles, oblongues à base cordée, sinuées-crênelées, généralement obtuses ou subaiguës à l'apex. Verticilles multiflores, assez rapprochés en grappes allongées, les inférieurs munis d'une feuille bractéale. Valves fructifères de plus de 2 mm de large, bordées de dents lancéolées en aîlène (plus de 1/4 de la largeur de la valve), dont généralement l'une d'elle porte un granule lisse allongé-pointu (très rarement les 3 pour la subsp. transiens)

■ *Salix atrocinerea* Brot. [Salicaceae]

Saule roux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5140>

■ *Sambucus ebulus* L. [Viburnaceae]

Sureau yèble

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1967>

Vivace à grandes tiges (jusqu'à 2 m) herbacées disparaissant l'hiver (donc non ligneuse), à feuilles composées de nombreuses folioles (9 à 11) et à fleurs à anthères violettes disposées en gros corymbes et fleurissant en pleine été.

Attention, plante très toxique à ne pas confondre avec le vrai sureau

■ *Sambucus nigra* L. [Viburnaceae]

Sureau noir

SAMBUC = nom latin du sureau, ; NIGR = noir

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1968>

C'est le vrai sureau, arbuste ou petit arbre avec de grands corymbes de fleurs blanches très odorantes à anthères jaunes fleurissant en fin de printemps, des feuilles à 5 folioles et des rameaux ligneux à moelle aérée.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires. Les fleurs et les fruits cuits sont comestibles. Crus les fruits sont laxatifs. Plante médicinale.

■ *Scrophularia auriculata* L. [Scrophulariaceae]

Scrofulaire auriculée au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5458>

■ *Solanum dulcamara* L. var. *dulcamara* [Solanaceae]

Morelle douce-amère commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=31164>

■ *Sonchus oleraceus* L. [Asteraceae]

Laiteron maraîcher

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1232>

■ *Stellaria aquatica* (L.) Scop. [Caryophyllaceae]

Stellaire aquatique

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2140>

■ *Symphytum officinale* L. [Boraginaceae]

Consoude Grande

<https://www.google.fr/search?q=Symphytum+officinale>

■ *Tanacetum vulgare* L. [Asteraceae]

Tanaisie commune

TANACET = nom latin de la tanaisie ; VULGAR = commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1251>

Odeur aromatique, saveur amère, médicinale, toxique à hautes doses, répandue par les invasions barbares. Tonique du système digestif, (dyspepsie, apéritif donc antianorexie), antihelminthique (vermifuge contre les ascaris et les oxyures), antianémique, diurétique, antispasmodique, contre la nervosité, dysménorrhées, leucorrhée, antiseptique cutanée anti-inflammatoire (entorses, contusions, goutte en traitement externe).

■ *Thalictrum flavum* L. [Ranunculaceae]

Pigamon jaune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14783>

■ *Torilis japonica* (Houtt.) DC. [Apiaceae]

Torilis du Japon au sens large

<https://www.google.fr/search?q=Torilis+japonica+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Ressemblant beaucoup à *T. arvensis* mais différente surtout par la présence d'un involucre de plusieurs bractées (souvent collées aux rayons : loupe) et par les aiguillons des fruits à pointe simple (loupe), par une base de la tige poilue (vs glabre) et poussant en milieux davantage forestiers.

■ *Urtica dioica* subsp. *galeopsifolia* (Wierzb. ex Opiz)

Chrtek [Urticaceae]

Ortie à feuilles de galéopsis

<https://www.google.fr/search?q=Urtica+dioica+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ *Verbascum pulverulentum* Vill. [Scrophulariaceae]

Molène pulvérulente

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5483>

Plante robuste (jusqu'à 1,50 m de haut), recouverte d'un duvet floconneux blanc se détachant facilement ; feuilles non décurrentes, larges, entières et brusquement terminées en pointe.

■ *Verbena officinalis* L. [Verbenaceae]

Verveine officinale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5710>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ *Veronica anagallis-aquatica* L. [Plantaginaceae]

Véronique mouron-d'eau

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5493>

■ *Viburnum opulus* L. [Viburnaceae]

Viorne obier

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1972>

cultivar. sterile DC. : Boule de neige. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, écorce

■ *Viscum album* L. [Santalaceae]

Gui d'Europe

<https://www.google.fr/search?q=Viscum+album+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Hémiparasite



Insectes - Lépidoptères

■ *Macrothylacia rubi* Linnaeus []

Le Bombyx de la Ronce

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14001542>