

Liste des taxons notés le mercredi 16 septembre 2026

Etat imprimé le 22 septembre 2026 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B. BOCK & al.)


Nous étions 12 participants à cette sortie. Nous sommes restés non loin de l'eau pour profiter des espèces pas trop desséchées par la sécheresse qui persiste. Quelques champignons ont pu être observés dont le *Perenniporia fraxinea* (voir photo ci-contre).



mercredi 16 septembre 2026

France - 28 : Coulombs

avec : GALAND Christian, MORICE Patrick, QUITARD Fanny, FEMENIA Marie-Isabelle, FEMENIA Pascal, MICHEL Jocelyne, LEVY Dominique, LALLEMENT Nicole, BIGOT Chantal, GOURRET Isabelle, ESTREGUIL Philippe & BOCK Benoît



Lichens - Champignons

■ *Ganoderma applanatum* (Pers.) Patouillard [Ganodermataceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2211841>
Polypore pérenne caractérisé par des pores brunissants au moindre contact

■ *Ramalina fastigiata* (Pers.) Ach. [Ramalinaceae]

<https://www.google.fr/search?q=Ramalina+fastigiata+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ *Rhytisma acerinum* (Pers. ex Fr.) Fr. [Rhytismataceae]

<https://www.google.fr/search?q=Rhytisma+acerinum+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>



Angiospermes Monocotylédones

■ *Carex remota* L. [Cyperaceae]

Carex espacé
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5969>

■ *Juncus inflexus* L. [Juncaceae]

Jonc glauque
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6146>
Grand jonc (jusqu'à 1 m) vivace cespiteux à tiges très glauques et gaines brillantes d'un pourpre-noir, à inflorescences lâches composées de fleurs à tépales longuement acuminés. Feuilles cloisonnées.

■ *Lemna minuta* Kunth [Araceae]

Lentille-d'eau minuscule
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6204>

■ *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. [Poaceae]

Roseau commun
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7063>



Angiospermes Dicotylédones

■ *Acer platanoides* L. [Sapindaceae]

Érable plane au sens large
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=29926>

Grand arbre à feuilles de 10 à 20 cm, glabres, vertes et luisantes en dessus, mates et pubescentes-blanchâtres en dessous, un peu en cœur à la base, à 5 lobes ovales à peine acuminés, fortement et inégalement dentés, séparés profondément par des sinus très aigus, à fleurs verdâtres nombreuses en grappes pendantes. Les samares sont disposées en forme d'accent circonflexe (angle droit). Ne possède pas de latex. Vit jusqu'à 500 ans

■ *Acer pseudoplatanus* L. [Sapindaceae]

Érable sycomore
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=11>
Grand arbre à feuilles de 10 à 20 cm, glabres, vertes et luisantes en dessus, mates et pubescentes-blanchâtres en dessous, un peu en cœur à la base, à 5 lobes ovales à peine acuminés, fortement et inégalement dentés, séparés profondément par des sinus très aigus, à fleurs verdâtres nombreuses en grappes pendantes. Les samares sont disposées en forme d'accent circonflexe (angle droit). Ne possède pas de latex. Vit jusqu'à 600 ans. Postpionnière nomade. Samare et jeune pousse très toxiques pour les chevaux.

■ *Actinidia chinensis* Planch. [Actinidiaceae]

Actinidia
<https://www.google.fr/search?q=Actinidia+chinensis+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>
Rarement Cultivée
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments

■ *Alcea rosea* L. [Malvaceae]

Rose-trémière commune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3801>
Puccinia malvacearum Montagne est responsable de la rouille de la rose trémière. Sans doute originaire de Turquie ou de Palestine, la rose trémière, autrefois encore appelée passerose, primrose, rose à bâton ou bâton de Jacob, aurait été ramenée par les Croisés au Moyen-âge (12ème et 13ème siècle). Dans le genre Althea, on trouve en Asie un soixantaine d'espèces différentes. L'espèce cultivée serait un hybride entre Althea rosea et Althea pallida de l'est de l'Europe et de l'ouest de l'Asie. De nombreux cultivars sont actuellement disponibles. [Bull. Soc. Mycol. Nord France, 90 : 13]

■ *Angelica sylvestris* L. [Apiaceae]

Angélique des prés au sens large
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8614>

■ *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [Apiaceae]

Cerfeuil des prés au sens large
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8626>
Ombellifère vivace, l'une des premières à fleurir au printemps, à corolle blanche, à feuillage vert sombre plus ou moins luisant et à tige ramifiée 2 ou 3 fois dès sa partie inférieure. Tige creuse facilement compressible. Feuilles sans stipules, pennatiséquées, à limbe long de 80-350 mm, à lobes pennatiséqués lancéolés plutôt aigus. Inflorescence en ombelle à 6-12 rayons de 15-30 mm, sans bractées, mais ombellules munies de bractéoles réfléchies, acuminées à l'apex et ciliées sur les bords. Fleurs à pédicelle inférieur à 6 mm, à pétales entiers ou à peine échancrés, les externes plus grands. Ovaire glabre, s'allongeant en cours de maturation, formant un fruit, à méricarpes (= moitié du fruit) non sillonnés, surmonté de 2 styles parallèles dressés.

Les tiges et les jeunes fruits sont comestibles crues ou cuites

■ *Arctium minus* (Hill) Bernh. [Asteraceae]

Bardane Petite
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=417>
Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - racine, graine, feuille immature, tige

■ ***Artemisia vulgaris*** L. [Asteraceae]

Armoise commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=459>

Grande composée en touffe dépassant facilement 1 m de haut, reconnaissable à ses feuilles dont les folioles sont profondément dentées, blanchâtres dessous à son odeur faible et désagréable, à ses inflorescences rameuses très amples et à ses souches non ou très brièvement stolonifères.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fleur, tige - thuyones, eucalyptol, camphre à surveiller - L'huile essentielle de cette plante est interdite.

■ ***Bryonia dioica*** Jacq. [Cucurbitaceae]

Bryone dioïque

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2547>

■ ***Carpinus betulus*** L. [Betulaceae]

Charme commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1328>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, bourgeon de feuille

■ ***Ceratophyllum demersum*** L. [Ceratophyllaceae]

Cératophylle commun

DEMERS = submergé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2301>

■ ***Chelidonium majus*** L. subsp. *majus* f. *majus*

[Papaveraceae]

Chélidoine Grande de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9311>

■ ***Cichorium intybus*** L. [Asteraceae]

Chicorée vivace

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=661>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fleur, feuille, racine

■ ***Clematis vitalba*** L. [Ranunculaceae]

Clématite des haies

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4436>

■ ***Corylus avellana*** L. [Betulaceae]

Noisetier commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1329>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, bourgeon de la feuille

■ ***Crataegus monogyna*** Jacq. [Rosaceae]

Aubépine monogyne

Mono = unique, gyn = femme - les fleurs n'ont qu'un seul ovaire (donc 1 seul style et les fruits une seule graine)

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4721>

Vit jusqu'à 500 ans; Hermaphrodite; rejette de souche; régulatrice de la régulation et sédatrice. Les jeunes feuilles et bourgeons, avant floraison, sont comestibles crues ou cuites.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, feuille, sommité fleurie - flavonoïdes, proanthocyanidols à surveiller

■ ***Cymbalaria muralis*** G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.

[Plantaginaceae]

Cymbalaire des murs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30073>

■ ***Echium vulgare*** L. [Boraginaceae]

Vipérine commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9898>

■ ***Erigeron annuus*** (L.) Desf. [Asteraceae]

Vergette annuelle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9945>

■ ***Erigeron sumatrensis*** Retz. [Asteraceae]

Vergette de Sumatra

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=702>

L'espèce est native d'Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Uruguay et régions adjacentes). Son nom est trompeur : Retzius l'a décrit en 1789 à partir de spécimens supposément collectés à Sumatra, mais il s'agissait vraisemblablement d'un matériel déjà introduit et naturalisé en Asie du Sud-Est à l'époque, ou d'une erreur d'étiquetage d'herbier — pratique malheureusement courante au XVIII^e siècle. Elle est mentionnée en Europe dès 1875.

■ ***Ficus carica*** L. [Moraceae]

Figuier commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30126>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - faux fruit, feuille, bourgeon de feuille, tige - furcoumarines (psoralène, bergaptène) à surveiller

■ ***Fraxinus excelsior*** L. subsp. *excelsior* var. *excelsior*

[Oleaceae]

Frêne élevé de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30618>

Diurétique, hypotensive, antirhumatismal, antilithiasique.

■ ***Geum urbanum*** L. [Rosaceae]

Benoîte commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4758>

Vivace en touffe à nombreuses racines la rendant difficile à déterrer, à odeur de clou de girofle. Feuilles basales pétiolées, à limbe à 1-3 paires de segments latéraux de taille très inférieure au terminal, indivis et très inégaux. Feuilles caulinaires 4 à 8 de taille très inférieure aux feuilles basales à plusieurs segments de taille différente. Stipules très développées. Inflorescence divariquée à 3-9 fleurs dressées. Calice à 5 sépales rabattus dès la fin de l'anthèse accompagné d'un calicule. Corolle bien épanouie à l'anthèse, à 5 pétales peu ou pas supérieurs aux sépales, jaune citrin. Réceptacle, ovaires et parfois base des styles hérissés de poils non glanduleux de 1 -2 mm. Akènes très nombreux (80 à 140) longs de 3-5 mm, à reste de style de 4-6 mm.

La racine séchée a longtemps été utilisée pour ses propriétés, en remplacement du clou de girofle dont elle a d'ailleurs l'odeur. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ ***Heracleum sphondylium*** L. [Apiaceae]

Berce sphondyle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=187>

■ ***Humulus lupulus*** L. [Cannabaceae]

Houblon d'Europe

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1947>

■ ***Hypochaeris radicata*** L. [Asteraceae]

Porcelle commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=967>

Vivace à latex à feuilles exclusivement en rosette basales presque entières, à face inférieure non entièrement glabre. Tiges ramifiées dès le milieu, munies de nombreuses feuilles avortées. Capitule à paillettes. Fleurs à ligules jaunes supérieures à 8 mm de long, dépassant l'involucre d'au moins 4 mm. Bractées involucrelles disposées sur 3 à 4 rangs, nettement croissantes de l'extérieur vers l'intérieur. Akènes avec bec et pappus de 2 rangs de soies plumeuses. (Confusions possibles avec *H. glabra*)

■ ***Juglans regia*** L. [Juglandaceae]

Noyer commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3506>

Les feuilles et le brou contiennent plusieurs principes colorants dont la juglone, une naphtoquinone. Une fermentation longue est nécessaire.

■ ***Ligustrum vulgare*** L. [Oleaceae]

Troène commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3955>

■ ***Linaria vulgaris*** Mill. [Plantaginaceae]

Linaire commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5377>

■ ***Lotus corniculatus*** L. [Fabaceae]

Lotier corniculé au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2988>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - partie aérienne fleurie, jeune fruit, racine - hétérosides cyanogènes à surveiller

■ ***Malus sylvestris*** Mill. [Rosaceae]

Pommier des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4762>

Quasiment systématiquement pollué génétiquement par *Malus domestica*.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, bourgeon, fleur, feuille, racine.

■ ***Medicago arabica*** (L.) Huds. [Fabaceae]

Luzerne d'Arabie

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3014>

Annuelle prostrée à pilosité éparses. Feuilles trifoliolées, très longuement pétiolées, à folioles obcordées, mucronées, glabres à la face supérieure, à **macule pourpre en son centre** dans la majorité des cas, seule la médiane courttement pétioulée. Stipules plus ou moins profondément dentées sur toute leur longueur, peu velues à glabres. Inflorescence à 2-5 fleurs, en capitules hémisphériques portés par un pédoncule peu velu, courttement aristé, nettement plus court que le pétiole de la feuille adjacente. Fleurs courttement pédicellées, à pédicelle non accrescent, plus court que le calice. Fleurs jaunes, petites. Étendard de 5-7 mm, légèrement plus long que les ailes et la carène, dépassant nettement le calice. Gousses en grappes courtes et denses, subcylindriques, à 5-6 tours de spire, dont le **dos porte trois sillons nets** (seule espèce), généralement épineux, dont les épines sont recourbées dans le plan des gousses, dès leur base.

■ ***Medicago sativa*** L. [Fabaceae]

Luzerne commune au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3041>

Contient de la vitamine K1 (contre anticoagulant).

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille - coumestrol, coumarines, alcaloïdes pyrrolidiniques à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'usage chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein.

■ ***Mentha spicata*** L. [Lamiaceae]

Menthe verte

<https://www.google.fr/search?q=Mentha+spicata+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, sommité fleurie - eucalyptol, pulégone, carvacrol, menthofurane à surveiller

■ ***Mentha suaveolens*** Ehrh. [Lamiaceae]

Menthe suave

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3593>

■ ***Myosotis scorpioides*** L. [Boraginaceae]

Myosotis des marais

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1419>

■ **Myriophyllum spicatum** L. [Haloragaceae]

Myriophylle en épi
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3463>

■ **Onobrychis viciifolia** Scop. [Fabaceae]

Esparcette commune au sens large
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=37048>

■ **Parietaria judaica** L. [Urticaceae]

Pariétaire de Judée
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5641>

■ **Picris hieracioides** L. [Asteraceae]

Picris fausse-épervière
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1102>

■ **Prunella vulgaris** L. [Lamiaceae]

Brunelle commune
<https://www.google.fr/search?q=Prunella+vulgaris&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>
 Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ **Pulicaria dysenterica** (L.) Bernh. [Asteraceae]

Pulicaire dysentérique
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1111>
 Pl. employée contre la dysentérie

■ **Ranunculus sceleratus** L. [Ranunculaceae]

Renoncule scélérate
<https://www.google.fr/search?q=Ranunculus+sceleratus>
 Annuelle pouvant dépasser 50 cm de haut, à feuilles profondément divisées, surtout reconnaissable à ses petites fleurs jaune pâle et ses akènes minuscules disposées en têtes allongées.
 2,5% de son poids sec correspond à une molécule toxique.

■ **Reseda lutea** L. subsp. **lutea** [Resedaceae]

Réséda jaune
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4605>
 Polymorphe

■ **Rubus caesius** L. [Rosaceae]

Ronce bleue
 RUB = ronce ; CAESI = bleu pâle un peu gris de vert
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4910>
 Ronce prostrée, à 3 folioles, sans poils sur les tiges et à pétiole sillonné sur toute sa longueur
 Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fruit

■ **Salix alba** L. [Salicaceae]

Saule blanc
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5134>
 Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, feuille - salicine à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi aux personnes souffrant d'allergie aux dérivés salicylés.

■ **Salix triandra** L. [Salicaceae]

Saule à trois étamines
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5177>

■ **Salvia pratensis** L. [Lamiaceae]

Sauge des prés
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3640>

■ **Sambucus nigra** L. [Viburnaceae]

Sureau noir
 SAMBUC = nom latin du sureau, ; NIGR = noir
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1968>
 C'est le vrai sureau, arbuste ou petit arbre avec de grands corymbes de fleurs blanches très odorantes à anthères jaunes fleurissant en fin de printemps, des feuilles à 5 folioles et des rameaux ligneux à moelle aérée.
 Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires. Les fleurs et les fruits cuits sont comestibles. Crus les fruits sont laxatifs. Plante médicinale.

■ **Sedum acre** L. [Crassulaceae]

Sédum âcre
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30350>
 Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ **Solanum dulcamara** L. [Solanaceae]

Morelle douce-amère
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5570>

■ **Solidago canadensis** L. [Asteraceae]

Solidage du Canada
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14559>

■ **Symphoricarpos albus** subsp. **albus** var. **laevigatus** (Fernald) S.F.Blake [Caprifoliaceae]

Symphorine lisse
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1970>

■ **Ulmus minor** Mill. [Ulmaceae]

Orme champêtre
 ULM = nom latin de l'orme ; MINOR = plus petit
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14872>

■ **Urtica dioica** L. [Urticaceae]

Ortie Grande
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14875>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes, racine - L'étiquetage des compléments alimentaires contenant les parties souterraines de cette plante doit comporter une mention recommandant de prendre conseil auprès d'un professionnel de santé : demander l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.

■ **Veronica anagallis-aquatica** L. [Plantaginaceae]

Véronique mouroin-d'eau
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5493>

■ **Viscum album** L. [Santalaceae]

Gui d'Europe
<https://www.google.fr/search?q=Viscum+album+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>
 Hémiparasite




Insectes - Lépidoptères

■ **Vanessa atalanta** Linnaeus []

Le Vulcain
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14001834>

France - 28 : Lormaye - Bords de l'Eure et de l'étang des Chandelles

avec : GALAND Christian, MORICE Patrick, QUITARD Fanny, FEMENIA Marie-Isabelle, FEMENIA Pascal, MICHEL Jocelyne, LEVY Dominique, LALLEMENT Nicole, BIGOT Chantal, GOURRET Isabelle, Philippe & BOCK Benoît



Lichens - Champignons

■ **Agaricus arvensis** J.C.Sch. : Fr. [Agaricaceae]

<https://www.google.fr/search?q=Agaricus+arvensis+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ **Daldinia concentrica** (Bolton ex Fr.) Cesati & de Notaris [Xylariaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2203957>
 Utilisé comme initiateur de feu

■ **Perenniporia fraxinea** (Bull. : Fr.) Ryvarden [Polyporaceae]

Polyporre du frêne
<https://www.google.fr/search?q=Perenniporia+fraxinea+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>
 Non comestible



Ptéridophytes

■ **Equisetum arvense** L. [Equisetaceae]

Prêle des champs
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7397>
 Tiges fertiles non chlorophylliennes vite disparues et des tiges stériles vertes et ramifiées. Le premier article des rameaux est plus long que la gaine correspondante (différence avec E. palustre). La section des rameaux est en forme de +
 Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes



Angiospermes Monocotylédones

■ **Glyceria maxima** (Hartm.) Holmb. [Poaceae]

Glycérie Grande
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6932>
 Plante toxique à hétérosides cyanogéniques

■ **Iris foetidissima** L. [Iridaceae]

Iris fétide
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6097>

■ **Lolium arundinaceum** (Schreb.) Darbysh. [Poaceae]

Grande-Fétuque commune au sens large
<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10048>



Angiospermes Dicotylédones

■ ***Acer campestre*** L. [Sapindaceae]

Érable champêtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8522>

Arbuste en général peu élevé (moins de 5 m, sauf exception), à feuilles de taille moyenne (10 cm max.), à 5 lobes arrondis et profonds et à samares aux ailes disposées en ligne droite.

Vit jusqu'à 200 ans. Parfois, comme les ormes, les rameaux développent parfois une couche de liège. Peut être utilisé comme un bois d'œuvre et comme arbre d'ornement. Mais la faible largeur du tronc rend son bois rare.

■ ***Acer negundo*** L. [Sapindaceae]

Érable négondo

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=29924>

Originaire du nord et du centre de l'Amérique. Espèce introduite en 1688 et devenue invasive des bords de cours d'eau.

■ ***Achillea millefolium*** L. [Asteraceae]

Achillée millefeuille au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8527>

Composée vivace, odorante, rampante (pouvant former des colonies très denses et étendues), à fleurs blanches ou rosées disposées en corymbe de capitules. Feuilles longues, étroites et finement divisées en lobe de 0,2-0,6 mm, mucronées.

Plante médicinale astringente permettant de stopper les hémorragies. En infusion elle réduit les spasmes digestifs et utérins, et est aussi anti-inflammatoire.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - thuyone (alpha et bêta), camphre, eucalyptol à surveiller

■ ***Arctium lappa*** L. [Asteraceae]

Bardane Grande

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=416>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ ***Argentina anserina*** (L.) Rydb. [Rosaceae]

Ansérine commune au sens large

<https://www.google.fr/search?q=Argentina+anserina+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ ***Betula pendula*** Roth [Betulaceae]

Bouleau verruqueux au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1325>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, écorce, bourgeon, sève - salicylate de méthyle à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi aux personnes souffrant d'allergie aux dérivés salicylés

■ ***Bidens tripartita*** L. [Asteraceae]

Bident cornuet

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=508>

■ ***Centaurea decipiens*** Thuill. [Asteraceae]

Centauree trompeuse

<https://www.google.fr/search?q=Centaurea+decipiens+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ ***Cirsium arvense*** (L.) Scop. [Asteraceae]

Cirse des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=664>

■ ***Cirsium vulgare*** (Savi) Ten. [Asteraceae]

Cirse commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=691>

Les jeunes pousses sont comestibles plutôt cuites

■ ***Convolvulus sepium*** L. [Convolvulaceae]

Liseron des haies au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2448>

■ ***Cornus sanguinea*** L. [Cornaceae]

Cornouiller sanguin au sens large

<https://www.google.fr/search?q=Cornus+sanguinea+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ ***Dipsacus fullonum*** L. [Caprifoliaceae]

Cardère commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2584>

■ ***Epilobium hirsutum*** L. [Onagraceae]

Épilobe hirsute

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3891>

Vivace dressée, à tiges souterraines traçantes, à feuilles inférieures opposées. Tige et feuilles hérissées de poils longs visibles de loin à l'oeil nu dans la partie médiane (mais glabres à la base). Feuilles à limbes lancéolés, dentés, sessiles et embrassant la moitié de la tige (donc adjacents 2 à 2). Grandes fleurs à pétales pourprés de 1,5 -2 cm et à style portant 4 stigmates étalés en croix.

■ ***Euonymus europaeus*** L. [Celastraceae]

Fusain d'Europe

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2298>

En raison de sa toxicité naturelle, le Fusain résiste à la plupart des phytophages. Il est cependant régulièrement victime des chenilles de petits papillons : Yponomeuta.

■ ***Filipendula ulmaria*** (L.) Maxim. var. ***ulmaria*** [Rosaceae]

Reine-des-prés Grande tomenteuse

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10090>

Plante herbacée très haute (plus de 1 m), à feuilles divisées en 3 à 5 paires de grandes folioles (6 x 3 cm) et à fleurs blanches, nombreuses, en corymbes amples. Fleurs à odeur de miel peu sucré. Face inférieure des feuilles banches ou vertes (var. denudata)

■ ***Helminthotheca echioides*** (L.) Holub [Asteraceae]

Picris langue-de-bœuf

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1101>

Grande plante annuelle ou bisannuelle, rugueuse et ramifiée à grandes feuilles embrassantes munies de poils raides partant d'une protubérance et capitules entourés de larges bractées foliacées, à fruits brusquement terminés par un fruit très long.

■ ***Lycopus europaeus*** L. [Lamiaceae]

Lycope d'Europe

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3576>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - coumarines, alcaloïdes à surveiller

■ ***Lysimachia nummularia*** L. [Primulaceae]

Lysimaque nummulaire

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4349>

■ ***Lysimachia vulgaris*** L. [Primulaceae]

Lysimaque commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30227>

■ ***Lythrum salicaria*** L. [Lythraceae]

Salicaire commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3792>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - sommité fleurie

■ ***Matricaria discoidea*** DC. [Asteraceae]

Matricaire suave

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1060>

sent l'ananas

■ ***Mentha aquatica*** L. [Lamiaceae]

Menthe aquatique

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3584>

■ ***Parthenocissus inserta*** (A.Kern.) Fritsch [Vitaceae]

Vigne-vierge commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5768>

Originaire du nord et de l'ouest de l'Amérique du Nord, introduite en Grande Bretagne dès 1821.

■ ***Plantago major*** L. [Plantaginaceae]

Plantain majeur

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4096>

Espèce toujours reconnaissable à ses très larges feuilles (5 à 10 cm), glabres et pétiolées, un peu dentées, souvent cordiformes et à ses inflorescences très longues (pouvant dépasser 10 cm)

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille

■ ***Polygonum aviculare*** L. [Polygonaceae]

Centinode des oiseaux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4224>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes, graine

■ ***Populus tremula*** L. [Salicaceae]

Peuplier tremble

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5131>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, bourgeon de feuille

■ ***Prunus avium*** (L.) L. [Rosaceae]

Cerisier des oiseaux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4827>

Arbre normalement sans drageon. Les feuilles possèdent deux nectaires extrafloraux sur leur pétiole.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, pédoncule

■ ***Robinia pseudoacacia*** L. [Fabaceae]

Robinier faux-acacia

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3124>

Genre dédié par Linné à Jean Robin (1550-1629), jardinier du roi Henri IV, ainsi qu'à son fils Vespasien Robin. Jean Robin l'a introduit en France en 1601, à partir de graines nord-américaines récoltées dans les Appalaches, offertes par le botaniste anglais John Tradescant l'ancien. Le robinier du square René-Viviani, dans le 5e arrondissement, juste en face de la cathédrale Notre-Dame, aurait été semé en 1601 ou 1602 par Jean Robin (Peabody, 1982). C'est le plus vieil arbre de la capitale. Occasionne des intoxications parfois graves chez les chevaux, en particulier lors d'ingestion de fruits, les graines concentrant les produits toxiques. Les symptômes sont des nausées, des diarrhées, une irritation, une mydriase et, dans les cas les plus sévères, une insuffisance respiratoire aiguë allant jusqu'à la mort. En revanche les fleurs sont comestibles (beignets, gâteaux, ...)

***Rubus* sp.** [Rosaceae]

Ronce au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=31181>

■ ***Salix atrocinerea*** Brot. [Salicaceae]

Saule roux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5140>

■ ***Scrophularia auriculata*** L. [Scrophulariaceae]

Scrofulaire auriculée au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5458>

■ ***Silene baccifera*** (L.) Roth [Caryophyllaceae]

Cucubale à baies

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2042>

■ ***Stachys sylvatica*** L. [Lamiaceae]

Épiaire des bois

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3697>

Pl. fétide

■ ***Tanacetum vulgare*** L. [Asteraceae]

Tanaisie commune

TANACET = nom latin de la tanaisie ; VULGAR = commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1251>

Odeur aromatique, saveur amère, médicinale, toxique à hautes doses, répandue par les invasions barbares. Tonique du système digestif, (dyspepsie, apéritif donc antianorexie), anthelminthique (vermifuge contre les ascaris et les oxyures), antianémique, diurétique, antispasmodique, contre la nervosité, dysménorrhées, leucorrhée, antiseptique cutanée anti-inflammatoire (entorses, contusions, goutte en traitement externe).

■ ***Trifolium fragiferum*** L. [Fabaceae]

Trèfle à fraises

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3154>

Vivace ascendante couchée radicante. Fleurs roses sessiles en tête subglobuleuse dense longuement pédonculée, entourée d'une couronne de bractées longues de 2 à 5 mm. Calice fructifère renflé en vessie membraneuse, veinée en réseau visible malgré la pilosité, à 10 nervures, à 2 lèvres, la supérieure disposée en casque et terminée par 2 pointes courtes, saillantes, non divariquées. Corolle ni renversée, ni scariée.

■ ***Trigonella altissima*** (Thuill.) Coulot & Rabaute

[Fabaceae]

Mévilot élevé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3054>

Grande plante bisannuelle, proche de *Melilotus officinalis* mais à jeunes fruits à poils appliqués (loupe), à fruits matures munis de côtes réticulées et croissant dans des milieux plus humides

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - coumarines à surveiller

■ ***Urtica dioica*** subsp. ***galeopsifolia*** (Wierzb. ex Opiz)

Chrték [Urticaceae]

Ortie à feuilles de galéopsis

<https://www.google.fr/search?q=Urtica+dioica+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Vicia sp. [Fabaceae]

Vesce au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=32946>



Insectes - Odonates

■ ***Ischnura elegans*** Vander Linden [Coenagrionidés]

Agrion élégant

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=16000044>

Les mâles sont noir-bronze avec la tête, le thorax, la base et le 8ème segment de l'abdomen marqués de bleu ciel à maturité. La bordure postérieure de leur pronotum est redressée. Les ptérostigmas sont bicolores (brun et blanc). Les jeunes mâles sont verts.

Les femelles présentent 3 formes. Les femelles matures de type A ressemblent beaucoup aux mâles mais les immatures ont un thorax lilas. Les femelles immatures de type B sont identiques mais deviennent brunâtres ou verdâtres terne à maturité. Les femelles C ont tout d'abord un thorax rose mais, une fois mature, ressemblent aux femelles B matures. Les vieilles femelles B et C peuvent devenir très sombres. Elles présentent une petite épine vulvaire sous le segment 8, à la base de l'ovipositeur.