

Liste des taxons notés le vendredi 2 octobre 2026

Etat imprimé le 12 octobre 2026 par Benoît BOCK

Nomenclature: Base de Données Nomenclaturales de la Flore de France (B. BOCK & al.)


La pluie nous a fait reporter la sortie du mercredi. Du coup, très beau temps ce vendredi. Nous avons tous les 15 même eu assez chaud. L'objectif de la sortie était d'observer des fleurs de colchique dont c'est en moment la floraison. C'était la fin de la floraison, mais nous avons pu en observer une dizaine. Photo ci-contre.



vendredi 2 octobre 2026

France - 28 : Charpont - Du cimetière vers Charpont par la vallée de retour par les Safranières

avec : PETIT Alain, MORICE Patrick, QUITARD Fanny, LEVY Dominique, BIGOT Chantal, GOURRET Isabelle, ESTEVE Marc, ESTEVE Mathilde, BILLARD Pascale, FEMENIA Pascal, KAID Mahdia, GALAND Christian, MICHEL Jocelyne, GUERZA Zineb, BOCK Benoît



Bryophytes

- ***Hylocomiadelphus triquetrus*** (Hedw.) Ochyra & Stebel



Mousse des jardiniers

De ὕλο□ / ὕλη (hylē, « bois, forêt ») et ἀδελφός (adelphos, « frère »)

<https://www.google.fr/search?q=Hylocomiadelphus+triquetrus>

Grande mousse touffue qui forme des pousses de 5 à 20 cm de long, avec des tiges rouges irrégulièrement ramifiées. Les feuilles, qui peuvent mesurer jusqu'à 6 mm de long, sont droites, pâles et pailletées, donnant à la pousse un aspect plutôt désordonné. La feuille a une double costa (= nervure), qui s'étend à peu près à mi-longueur du limbe, et les bords sont légèrement dentés. Les capsules sont rares à occasionnelles.



Gymnospermes

- ***Juniperus communis*** L. var. ***communis*** [Cupressaceae]

Genévrier commun des plaines

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12343>

- ***Pinus nigra*** J.F. Arnold [Pinaceae]

Pin noir

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7281>



Angiospermes Monocotylédones

- ***Carex flacca*** Schreb. subsp. ***flacca*** [Cyperaceae]

Carex glauque commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9014>

Rhizomateuse hétérostachyée de 30 à 60 cm de haut, à feuilles de 3 à 4 mm de large de couleur typiquement glauque et à épillets femelles brunâtres composés d'utricules arrondis et dépourvus de bec.

- ***Colchicum autumnale*** L. [Colchicaceae]

Colchique d'automne

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6293>



Angiospermes Dicotylédones

- ***Bryonia dioica*** Jacq. subsp. ***dioica*** [Cucurbitaceae]

Bryone dioïque dioïque

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=66310>

- ***Buxus sempervirens*** L. [Buxaceae]

Buis commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1842>

Les vieux exemplaires peuvent héberger sur leurs feuilles un lichen assez rare : *Felhanera bouteillei*.

Les feuilles sont attaquées par la chenille de la Pyrale du buis (*Cydalima perspectalis*) est une espèce de lépidoptères de la famille des Crambidae, originaire d'Extrême-Orient. L'affaiblissement engendré favorise le développement d'un champignon *Cylindrocladium buxicola*, notamment dans les zones humides !

- ***Centaurea scabiosa*** L. subsp. ***scabiosa*** [Asteraceae]

Centauree scabieuse

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9194>

- ***Dianthus armeria*** L. [Caryophyllaceae]

Œillet armérie au sens large

<https://www.google.fr/search?q=Dianthus+armeria+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

- ***Dipsacus fullonum*** L. [Caprifoliaceae]

Cardère commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2584>

- ***Eryngium campestre*** L. [Apiaceae]

Panicaut champêtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=172>

On mangeait autrefois sa racine qui passe pour diurétique, apéritive, emménagogue. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - racine, jeune feuille, jeune pousse, foliole séchée - furocoumarines, polyènes à surveiller

- ***Gentianaella germanica*** (Willd.) Börner [Gentianaceae]

Gentiane d'Allemagne

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3385>

- ***Helleborus foetidus*** L. [Ranunculaceae]

Hellébore fétide

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4455>

- ***Ligustrum vulgare*** L. [Oleaceae]

Troène commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3955>

- ***Lycopsis arvensis*** L. [Boraginaceae]

Buglosse des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1341>

- ***Lysimachia arvensis*** (L.) U. Manns & Anderb. subsp. ***arvensis*** [Primulaceae]

Mouron des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4306>

Pl vulnérable et astringente, graines toxiques

- ***Malva neglecta*** Wallr. [Malvaceae]

Mauve négligée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3827>

■ *Medicago sativa* L. [Fabaceae]

Luzerne commune au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3041>

Contient de la vitamine K1 (contre anticoagulant).

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille - coumestrol, coumarines, alcaloïdes pyrrolidiniques à surveiller - L'étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'usage chez les femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein.

■ *Origanum vulgare* L. [Lamiaceae]

Origan commun au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3618>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - carvacrol à surveiller

■ *Picris hieracioides* L. [Asteraceae]

Picris fausse-épervière

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1102>

■ *Plantago coronopus* L. [Plantaginaceae]

Plantain corne-de-cerf

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4088>

■ *Plantago lanceolata* L. [Plantaginaceae]

Plantain lancéolé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4094>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille

■ *Polygonum aviculare* L. [Polygonaceae]

Centinode des oiseaux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4224>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes, graine

■ *Poterium sanguisorba* L. subsp. *sanguisorba*

[Rosaceae]

Pimprenelle Petite commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14282>

■ *Rumex thyrsiflorus* Fingerh. [Polygonaceae]

Oseille à oreillettes

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30328>

Espèce diploïde

■ *Scabiosa columbaria* L. subsp. *columbaria*

[Caprifoliaceae]

Scabieuse colombarie commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14372>

■ *Silybum marianum* (L.) Gaertn. [Asteraceae]

Silybe chardon-Marie

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1212>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes, fruit. La plante contient (surtout les graines broyées) de la silybine qui semble être une molécule protectrice et régénératrice du foie !

■ *Verbascum pulverulentum* Vill. [Scrophulariaceae]

Molène pulvérulente

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5483>

Plante robuste (jusqu'à 1,50 m de haut), recouverte d'un duvet floconneux blanc se détachant facilement ; feuilles non décurrentes, larges, entières et brusquement terminées en pointe.

■ *Viburnum lantana* L. var. *lantana* [Viburnaceae]

Viorne lantane commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1971>


■ *Weigela florida* (Bunge) A.DC. [Caprifoliaceae]

Weigélia rose

<https://www.google.fr/search?q=Weigela+florida+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

France - 28 : Écluzelles - Du cimetière vers Charpont par la vallée de retour par les Safranières

avec : PETIT Alain, MORICE Patrick, QUITARD Fanny, LEVY Dominique, BIGOT Chantal, GOURRET Isabelle, ESTEVE Marc, ESTEVE Mathilde, BILLARD Pascale, FEMENIA Pascal, KAID Mahdia, GALAND Christian, MICHEL Jocelyne, GUERZA Zineb, BOCK Benoît



Lichens - Champignons

■ *Daldinia concentrica* (Bolton) Ces. & De Not.

[Xylariaceae]

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=-2203957>

Utilisé comme initiateur de feu



Angiospermes Monocotylédones

■ *Asparagus officinalis* L. subsp. *officinalis*

[Asparagaceae]

Asperge officielle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6272>

■ *Deschampsia cespitosa* (L.) P.Beauv. [Poaceae]

Deschampsie élevée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6764>

■ *Eragrostis minor* Host [Poaceae]

Éragrostis Petit

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6817>

■ *Iris foetidissima* L. [Iridaceae]

Iris fétide

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=6097>

■ *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. [Poaceae]

Roseau commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=7063>



Angiospermes Dicotylédones

■ *Acer campestre* L. [Sapindaceae]

Érable champêtre

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8522>

Arbuste en général peu élevé (moins de 5 m, sauf exception), à feuilles de taille moyenne (10 cm max.), opposées, à 5 lobes arrondis et profonds et à samares aux ailes disposées en ligne droite. Présence de latex visible à la cassure d'un pétiole.

Vit jusqu'à 200 ans. Parfois, comme les ormes, les rameaux développent parfois une couche de liège. Peut être utilisé comme un bois d'œuvre et comme arbre d'ornement. Mais la faible largeur du tronc rend son bois rare.

■ *Achillea millefolium* L. [Asteraceae]

Achillée millefeuille au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8527>

Composée vivace, odorante, rampante (pouvant former des colonies très denses et étendues), à fleurs blanches ou rosées disposées en corymbe de capitules pauvres en fleurons. Feuilles longues, étroites et finement divisées en centaines de lobes de 0,2-0,6 mm, mucronées.

Plante médicinale astringente permettant de stopper les hémorragies. En infusion elle réduit les spasmes digestifs et utérins, et est aussi anti-inflammatoire.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes - thuyone (alpha et bêta), camphre, eucalyptol à surveiller

■ *Alcea rosea* L. [Malvaceae]

Rose-trémière commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3801>

Puccinia malvacearum Montagne est responsable de la rouille de la rose trémière. Sans doute originaire de Turquie ou de Palestine, la rose trémière, autrefois encore appelée passerose, primrose, rose à bâton ou bâton de Jacob, aurait été ramenée par les Croisés au Moyen-âge (12ème et 13ème siècle). Dans le genre Althea, on trouve en Asie un soixantaine d'espèces différentes. L'espèce cultivée serait un hybride entre Althea rosea et Althea pallida de l'est de l'Europe et de l'ouest de l'Asie. De nombreux cultivars sont actuellement disponibles. [Bull. Soc. Mycol. Nord France, 90 : 13]

■ ***Alnus glutinosa*** (L.) Gaertn. [Betulaceae]

Aulne glutineux

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1321>

En symbiose avec un actinomycète du genre Frankia fixateur d'azote atm.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, feuille, bourgeon de feuille.

■ ***Argentina anserina*** (L.) Rydb. [Rosaceae]

Ansérine commune au sens large

<https://www.google.fr/search?q=Argentina+anserina+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ ***Artemisia vulgaris*** L. [Asteraceae]

Armoise commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=459>

Grande composée en touffe dépassant facilement 1 m de haut, reconnaissable à ses feuilles dont les folioles sont profondément dentées, blanchâtres dessous à son odeur faible et désagréable, à ses inflorescences rameuses très amples et à ses souches non ou très brièvement stolonifères.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fleur, tige - thuyones, eucalyptol, camphre à surveiller - L'huile essentielle de cette plante est interdite.

■ ***Campanula portenschlagiana*** Schult. [Campanulaceae]

Campanule des murailles

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=8922>

■ ***Centaurea decipiens*** Thuill. [Asteraceae]

Centauree trompeuse

<https://www.google.fr/search?q=Centaurea+decipiens+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ ***Centranthus ruber*** (L.) DC. [Caprifoliaceae]

Centranthe rouge au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30034>

■ ***Cercis siliquastrum*** L. [Fabaceae]

Gainier de Judée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30040>

■ ***Chelidonium majus*** L. [Papaveraceae]

Chélidoine Grande

Autrefois la Ficaire était appelée Petite chélidoine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4026>

■ ***Chenopodium album*** L. subsp. ***album*** [Amaranthaceae]

Chénopode blanc commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=9313>

■ ***Clematis vitalba*** L. [Ranunculaceae]

Clématite des haies

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4436>

■ ***Cornus sanguinea*** L. [Cornaceae]

Cornouiller sanguin au sens large

<https://www.google.fr/search?q=Cornus+sanguinea+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ ***Crataegus monogyna*** Jacq. [Rosaceae]

Aubépine monogyne

Mono = unique + gyn = femme - les fleurs n'ont qu'un seul ovaire (donc 1 seul style et les fruits une seule graine)

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4721>

Vit jusqu'à 500 ans; Hermaphrodite; rejette de souche; régulatrice de la régulation et sédatrice. Les jeunes feuilles et bourgeons, avant floraison, sont comestibles crues ou cuites.

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, feuille, sommité fleurie - flavonoïdes, proanthocyanidols à surveiller

■ ***Cruciata laevipes*** Opiz [Rubiaceae]

Croisette commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5034>

■ ***Cymbalaria muralis*** G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. f. ***muralis*** [Plantaginaceae]

Cymbalaire des murs de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5320>

■ ***Euphorbia lathyris*** L. [Euphorbiaceae]

Euphorbe épurge

Lathyris = nom grec de l'Épurge

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=2717>

Bisannuelle dressée pouvant atteindre 1 m de haut à tige creuse, avec des feuilles d'un vert bleuâtre foncé glauque, sans dents et sans poils, à une seule nervure claire, disposées par paires régulièrement en croix (opposées décussées), rarement verticillées par 3 ou encore très rarement alternes au sommet, pouvant atteindre 12 cm de long. Ombelles assez grandes à 2 à 5 rayons. Bractées aiguës de 3 à 10 cm de long. Glandes de l'involucre jaune en croissant, à cornes courtes spatulées-obtus. Capsule très grosse (1 cm.), ovoïde-trigone, glabre, à coques arrondies et lisses.

■ ***Filipendula ulmaria*** (L.) Maxim. var. ***ulmaria*** [Rosaceae]

Reine-des-prés Grande tomenteuse

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10090>

Plante herbacée très haute (plus de 1 m), à feuilles divisées en 3 à 5 paires de grandes folioles (6 x 3 cm) et à fleurs blanches, nombreuses, en corymbes amples. Fleurs à odeur de miel peu sucré. Face inférieure des feuilles blanches ou vertes (var. *denudata*)

■ ***Hedera helix*** L. subsp. ***helix*** [Araliaceae]

Lierre commun

<https://www.google.fr/search?q=Hedera+helix+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

■ ***Helminthotheca echioides*** (L.) Holub [Asteraceae]

Picris langue-de-bœuf

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1101>

Grande plante annuelle ou bisannuelle, rugueuse et ramifiée à grandes feuilles embrassantes munies de poils raides partant d'une protubérance et capitules entourés de larges bractées foliacées, à fruits brusquement terminés par un fruit très long.

■ ***Heracleum sphondylium*** L. [Apiaceae]

Berce sphondyle

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=187>

■ ***Hibiscus rosa-sinensis*** L. [Malvaceae]

Hibiscus rose-de-Chine

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=10368>

■ ***Humulus lupulus*** L. [Cannabaceae]

Houblon d'Europe

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1947>

■ ***Impatiens balfourii*** Hook.f. [Balsaminaceae]

Balsamine de Balfour

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1304>

■ ***Jacobaea vulgaris*** Gaertn. subsp. ***vulgaris*** [Asteraceae]

Sèneçon jacobée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14453>

■ ***Juglans regia*** L. [Juglandaceae]

Noyer commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3506>

Les feuilles et le brou contiennent plusieurs principes colorants dont la juglone, une naphtoquinone. Une fermentation longue est nécessaire.

■ ***Knautia arvensis*** (L.) Coult. [Caprifoliaceae]

Knautie des champs

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30193>

■ ***Lamium album*** L. [Lamiaceae]

Lamier blanc

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3557>

Plante médicinale : diurétique, hémostatique et propriétés toniques, rafraîchissantes ou vulnérables. Les jeunes feuilles et les fleurs sont comestibles. Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - corolle mondée, sommité fleurie, feuille

■ ***Linaria vulgaris*** Mill. [Plantaginaceae]

Linaira commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5377>

■ ***Lunaria annua*** L. [Brassicaceae]

Lunaire monnaie-du-pape

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30221>

■ ***Lythrum salicaria*** L. [Lythraceae]

Salicaire commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3792>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - sommité fleurie

■ ***Melissa officinalis*** L. [Lamiaceae]

Mélisse officinale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=3581>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille - eucalyptol, méthyleugénol à surveiller

■ ***Mentha suaveolens*** Ehrh. subsp. ***suaveolens*** [Lamiaceae]

Menthe suave commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=12664>

■ ***Mirabilis jalapa*** L. [Nyctaginaceae]

Belle-de-nuit commune

<https://www.google.fr/search?q=Mirabilis+jalapa+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Herbe dressée haute de 30-70 cm à feuilles opposées. Fleurs jaunes ou pourpres, s'ouvrant la nuit, hermaphrodites, actinomorphes, entourées à la base par un involucre simulat un calice (parfois plusieurs fleurs groupées dans un involucre). Périanth long de 3-4 cm, subdivisé par une constriction en une partie basale plus ou moins tubuleuse, renflée, et une partie distale corolline à limbe étalé, circulaire, plus ou moins profondément 5-lobé. Étamines 3-5, exsertes. Stigmate densément fimbrié. Anthocarpe à paroi plus ou moins épaisse, visqueuse

■ ***Parietaria judaica*** L. [Urticaceae]

Pariétaire de Judée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5641>

■ ***Pastinaca sativa*** L. [Apiaceae]

Panais commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=237>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - toutes parties

■ ***Plantago major*** L. subsp. ***major*** [Plantaginaceae]

Plantain majeur de Linné

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=13305>

Espèce toujours reconnaissable à ses très larges feuilles (5 à 10 cm), glabres et pétiolées, un peu dentées, souvent cordiformes et à ses inflorescences très longues (pouvant dépasser 10 cm)

■ **Potentilla neglecta** Baumg. [Rosaceae]

Potentille négligée

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4804>

■ **Potentilla reptans** L. [Rosaceae]

Potentille rampante

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4818>

Plante stolonifère, couchée et radicante, velue à feuilles composées-palmées presque toutes à 5 folioles (rarement 7) à folioles obovales allongées, vertes dessus. Fleurs isolées aux nœuds sur de très longs pédicelles à 5 pétales jaune vif de 6-12 mm, dépassant nettement le calice. Réceptacle bombé, non charnu, portant de nombreux akènes (plus de 60).

Pl. astringente, vulnérable et tonique

■ **Prunus spinosa** L. [Rosaceae]

Prunellier commun

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4847>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - fruit, feuille, fleur

■ **Quercus robur** L. [Fagaceae]

Chêne pédonculé

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30308>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - écorce, feuille, bourgeon de feuille, graine

■ **Reseda lutea** L. [Resedaceae]

Réséda jaune au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30314>

■ **Rubus caesius** L. [Rosaceae]

Ronce bleue

Rub = ronce + caesi = bleu pâle un peu gris de vert

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4910>

Ronce prostrée, à 3 folioles, sans poils sur les tiges et à pétiole sillonné sur toute sa longueur

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - feuille, fruit

■ **Rubus ulmifolius** Schott [Rosaceae]

Ronce rustique

Rub = ronce + uml = orme + foli = feuille

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=4969>

Espèce sexuée.

■ **Seseli montanum** L. [Apiaceae]

Séséli des montagnes au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=30360>

■ **Silene vulgaris** (Moench) Garcke [Caryophyllaceae]

Silene commun au sens large

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14537>

■ **Solanum dulcamara** L. var. **dulcamara** [Solanaceae]

Morelle douce-amère commune

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=31164>

■ **Sonchus oleraceus** L. [Asteraceae]

Laiteron maraîcher

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=1232>

■ **Ulmus minor** Mill. [Ulmaceae]

Orme champêtre

Ulm = nom latin de l'orme + minor = plus petit

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14872>

■ **Urtica dioica** L. [Urticaceae]

Ortie Grande

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14875>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes, racine - L'étiquetage des compléments alimentaires contenant les parties souterraines de cette plante doit comporter une mention recommandant de prendre conseil auprès d'un professionnel de santé : demander l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.

■ **Verbena officinalis** L. [Verbenaceae]

Verveine officinale

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=5710>

Une des 540 espèces dont l'emploi est autorisé dans les compléments alimentaires - parties aériennes

■ **Viscum album** L. [Santalaceae]

Gui d'Europe

<https://www.google.fr/search?q=Viscum+album+&hl=fr&udm=2#vhid=n12c>

Hémiparasite



Insectes - Lépidoptères

■ **Vanessa cardui** Linnaeus []

La Belle-Dame

<http://www.photoflora.fr/FiTaxMax.php?NumTaxon=14001835>